



Pz di 37 anni, nullipara.

Riferisce dismenorrea, dispareunia, cicli regolari, dolore sovrapubico, cistiti ricorrenti, talvolta macroematuria.



Di cosa si tratta?



1. Polipo vescicale
2. Papilloma vescicale
3. Nodulo endometrioso vescicale
4. Carcinoma uroteliale della vescica



Di cosa si tratta?

1. Polipo vescicale
2. Papilloma vescicale
3. **Nodulo endometrioso vescicale**
4. Carcinoma uroteliale della vescica

ECO TV 2D: in corrispondenza della base vescicale si evidenzia una formazione sferica, ipoecogena, a margini lievemente irregolari, delle dimensioni di 1,2 cm x 1,3 cm x 1,3 cm, non vascolarizzata al CD (CS 1/4) che sembra infiltrare la tonaca muscolare vescicale e appare dolente alla sondopressione e fissa rispetto ai piani circostanti.



Le lesioni della vescica interessano più frequentemente la base e la cupola vescicale rispetto alla porzione extraddominale. L'ecografia TV è eseguita a vescica semipiena, riducendo in questo modo i falsi negativi. Alla valutazione 2D il nodulo endometrioso vescicale appare come una lesione ipoecogena lineare o sferica, a margini regolari o non; se ne definiscono le tre dimensioni e la sua distanza dal trigono.

Si definiscono **superficiali** se interessano la sola tonaca sierosa, **profondi** quando infiltrano la tonaca muscolare e/o raramente la mucosa della vescica.