


Paziente di 42 anni, G2P1 a 34 settimane di gravidanza



Scansione sagittale mediana dell'encefalo



scansione 4 camere

Di cosa si tratta?

1. Cisti aracnoidea
2. Aneurisma della Vena di Galeno
3. Dandy Walker Malformation
4. Idrocefalia tetraentricolare



Di cosa si tratta?

1. Cisti aracnoidea
- 2. Aneurisma della Vena di Galeno**
3. Dandy Walker Malformation
4. Idrocefalia tetraventricolare

*Prevalenza sulle sezioni
destre cardiache
sulle sinistre*

- *La malformazione aneurismatica della vena di Galeno (MAVG) è una malformazione vascolare congenita, da dilatazione dei precursori embrionali della vena di Galeno.*
- *È una lesione che insorge durante l'embriogenesi, rara, descritta in meno di 800 casi (meno del 10% di tutte le malformazioni cerebrali artero-venose).*
- *La MAVG viene solitamente individuata con l'ecografia III trimestre di gravidanza:*
 - *La presenza di una voluminosa formazione anecogena mediana, a volte tipicamente oblunga, fa sospettare una MAVG*
 - *La presenza di flusso evidenziabile al color Doppler ne suggerisce la diagnosi*
 - *L'impatto sulla circolazione generale è deducibile dalla prevalenza delle sezioni cardiache destre*
- *In questo caso, due reperti sono indicativi di una prognosi grave: l'insufficienza cardiaca e il danno cerebrale identificato con la risonanza magnetica cerebrale.*
- *Il neonato dovrebbe essere preso in carico dall'unità intensiva di pediatria e da un gruppo esperto di neurologi pediatri.*

