


A cura: Dott.ssa Carolina Scala MD, Ospedale Giannina Gaslini, Ostetricia e Ginecologia, Genova

Secondigravida, 26 anni, Gravidanza spontanea


Test combinato negativo.

Ecografia morfologica: riferita per neoformazioni cistiche multiple addominali



Di cosa si tratta?

1. Ostruzione intestinale
2. Idroureteronefrosi severa unilaterale
3. Rene displastico multicistico unilaterale
4. Neoformazione cistica ovarica



Si tratta di un caso di **Rene Displastico Multicistico Unilaterale**.

Il rene multicistico (anche detto multicistico displastico) descrive una categoria di patologie caratterizzate dalla formazione di cisti renali, per lo più unilaterali, accompagnate da displasia e mancata funzionalità renale.

Questa condizione, nella maggior parte dei casi unilaterale, si ritiene sia dovuta ad un difetto durante lo sviluppo embrionale del rene.

La diagnosi ecografica viene solitamente posta a partire dalle 18-20 settimane di amenorrea e l'ecografia ostetrica ha un accuratezza diagnostica di >90%.

Il rene displastico multicistico unilaterale, in assenza di altre malformazioni fetali, ha una prognosi eccellente.

Di cosa si tratta?

1. Ostruzione intestinale
2. Idroureteronefrosi severa unilaterale
3. **Rene displastico multicistico unilaterale**
4. Neoformazione cistica ovarica