

Raccomandazioni SIEOG per la programmazione dell'attività ecografica

- **Gli esami ecografici di screening** previsti nella gravidanza fisiologica devono essere eseguiti **con i tempi e le modalità previste dalle linee guida SIEOG** del 2015 sia in pazienti asintomatiche sia in pazienti con sospetta/confermata infezione da SARS-CoV2 o con riferiti contatti stretti con individui con confermata o sospetta positività negli ultimi 14 giorni (vedi Appendice)
- **Gli esami ecografici non urgenti** e/o differibili in pazienti con sospetta/confermata infezione da virus SARS-CoV2 o con riferiti contatti stretti con individui con confermata o sospetta positività negli ultimi 14 giorni devono essere **procrastinati di 14 giorni** (vedi Appendice)
- La **lista ecografica** deve essere **revisionata** con cadenza settimanale ed eventualmente riprogrammata in considerazione
 - della situazione contingente,
 - della disponibilità/indisponibilità degli operatori e
 - dell'epoca gestazionale e indicazione degli esami ecografici.Nel caso in cui il responsabile della programmazione ritenga indicato differire un esame ecografico non urgente, la paziente deve essere informata telefonicamente che
 - il differimento dell'esame non modifica in modo sostanziale il monitoraggio della gravidanza e
 - la scelta di differire l'esame ecografico è dettata dalla necessità di proteggere la gestante ed il feto dall'epidemia in corso
- La programmazione ecografica deve prevedere il **distanziamento degli appuntamenti** di un tempo sufficiente in modo che ciascun esame ecografico possa essere verosimilmente concluso prima dell'orario di inizio dell'esame successivo (minimo 30 max 60 minuti in base al tipo di esame ecografico e all'indicazione clinica) al fine di minimizzare la possibilità di attesa di più di una paziente negli spazi comuni
- La programmazione/riprogrammazione degli appuntamenti deve avvenire per via telefonica o telematica
- La paziente deve essere contattata telefonicamente un giorno prima dell'appuntamento programmato in modo da verificare l'assenza di sintomi e di contatti stretti con individui con confermata o sospetta positività per SARS-CoV2 negli ultimi 14 giorni

Appendice 1

	Basso rischio SARS-CoV2	Infezione certa o probabile da SARS-CoV2
Ecografia I trimestre per test combinato	si	si
Ecografia di screening del II trimestre	si	si
Ecografia morfologica su specifica indicazione	si	si
Altra ecografia eseguita su specifica indicazione	valutare differibilità	valutare differibilità
Procedure di diagnosi prenatale invasiva	si	valutare differibilità