

Lucia De Meis

Clinica Ostetrica e Ginecologica

Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Università di Bologna

37 anni


PARA 1001, 1 PS

Dolore pelvico, perdite ematiche genitali

Beta HCG 78450 UI/L



Di cosa si tratta?

1. Residui trofoblastici
2. Gravidanza ectopica interstiziale
3. Gravidanza angolare
4. Tumefazione mesenchimale sospetta



## GRAVIDANZA ECTOPICA INTERSTIZIALE

- 2-4% di tutte le gravidanze ectopiche
- L'impianto avviene nella parte più prossimale della tuba quando passa attraverso il miometrio
- Gestione estremamente complessa
- Lungo follow-up



INTERSTIZIALE

ANGOLARE

# GRAVIDANZA ECTOPICA INTERSTIZIALE

## Criteri ecografici

- *Posizione eccentrica della camera gestazionale al di fuori della cavità uterina che risulta vuota*
- *Ridotto spessore miometriale (<5mm) a livello della porzione cranio laterale della camera gestazionale*
- *«Interstitial line»: in scansione trasversa a livello del fondo si visualizza la mucosa endometriale che si assottiglia lateralmente continuando nella mucosa tubarica in una linea sottile che si dirige verso la GEU*
- *Marcata vascolarizzazione e formazioni di MAV (malformazioni artero-venose)*



Ackerman, 1993  
Dubilet, 2003