


Elaborato da Dott.ssa Sara Zullino

SOD Medicina Prenatale - DAIMI  
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze

*Thanks to Lucia Pasquini and Serena Ottanelli*

## Episodio di perdite ematiche in G2P0 pre-TC, 27 settimane



### Di cosa si tratta?


1. Percretismo vescicale in placenta previa centrale
2. Corioangioma placentare
3. Ematoma in placenta previa centrale
4. Lacune placentari isolate in placenta previa centrale

Elaborato da Dott.ssa Sara Zullino

SOD Medicina Prenatale - DAIMI  
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze

Thanks to Lucia Pasquini and Serena Ottanelli

## Episodio di perdite ematiche in G2P0 pre-TC, 27 settimane



### Di cosa si tratta?

- 1. Percretismo vescicale in placenta previa centrale**
2. Corioangioma placentare
3. Ematoma in placenta previa centrale
4. Lacune placentari isolate in placenta previa centrale

Elaborato da Dott.ssa Sara Zullino


SOD Medicina Prenatale - DAIMI  
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze

Thanks to Lucia Pasquini and Serena Ottanelli


## SOLUZIONE:

**Percretismo vescicale in placenta previa centrale**

## CASO CLINICO:



**RM:** Placenta previa centrale completa con margini irregolari caratterizzati da **multiple lacune ipointense vascolari** ed area disomogenea a margini spiculati sul versante destro che sembra estendersi ai vasi periuterini; **aspetto moderatamente eroso della porzione anteriore dell'ostio uterino interno**; sul margine anteriore della placenta si associa inoltre ispessimento della plica vescico-uterina ed **irregolare tumefazione della parete della cupola vescicale**



Ripetuti episodi di perdite ematiche.

TC a 30 settimane organizzato in sala operatoria ibrida

- Radiologia interventistica
- Posizionamento palloni da occlusione profilattica in a. ipogastriche
- Attivazione colleghi urologia
- Intervento semiconservativo (triple P)