


Elaborato da Dott.ssa Maria Elena Mugavero

U.O.S. Medicina fetale e Diagnosi Prenatale
Ospedali riuniti "Villa Sofia- V. Cervello", Palermo

- Paziente secondigravida di 35 anni a 34+5 ws
- Diabete gestazionale
- Test combinato a basso rischio per T21/T18/T13
- Ecografia di screening del II trimestre nella norma



Di cosa si tratta?


1. Macroglossia
2. Epulide congenita
3. Teratoma orale
4. Emangioma



Elaborato da Dott.ssa Maria Elena Mugavero


U.O.S. Medicina fetale e Diagnosi Prenatale
Ospedali riuniti "Villa Sofia- V. Cervello", Palermo

- Paziente secondigravida di 35 anni a 34+5 ws
- Diabete gestazionale
- Test combinato a basso rischio per T21/T18/T13
- Ecografia di screening del II trimestre nella norma



Di cosa si tratta?

1. Macroglossia
2. **Epulide congenita**
3. Teratoma orale
4. Emangioma



Elaborato da Dott.ssa Maria Elena Mugavero

U.O.S. Medicina fetale e Diagnosi Prenatale
Ospedali riuniti "Villa Sofia- V. Cervello", Palermo

SOLUZIONE

2. EPULIDE CONGENITA

L'epulide congenita, nota anche come **tumore congenito a cellule granulari**, è una condizione estremamente rara nei neonati (incidenza dello 0.0006 %) e più frequente nel sesso femminile con un rapporto F:M 10:1.



Le lesione :

- ha spesso un colore simile alla mucosa orale
- può essere pedunculata o non pedunculata
- varia in dimensioni da pochi millimetri a >10 cm
- origina più frequentemente dalla mucosa gengivale che ricopre l'arcata alveolare superiore o più raramente dalla mandibola.
- si presenta ecograficamente come una massa omogenea, a margini regolari che origina dalla regione gengivale dell'arcata superiore. Il Color Doppler mostra i vasi sanguigni che entrano nella massa attraverso il peduncolo (d.d. emangioma).

Sebbene benigna, l'escissione chirurgica immediata è raccomandata per lesioni più grandi o multiple poiché vi è un rischio significativo di ostruzione delle vie aeree e difficoltà nella deglutizione.

La diagnosi prenatale di un'epulide congenita di grandi dimensioni può fornire indicazioni sulla scelta della modalità di parto. Sono questi i casi in cui è indicato l'espletamento del parto mediante taglio cesareo e procedura EXIT (ex utero intrapartum treatment).